


Vaccination des 55-79 ans (AstraZeneca, Janssen)

Attention : les vaccins AstraZeneca et Janssen ne sont plus disponibles à la commande.
 Cette procédure vaut donc pour toute vaccination déjà débutée par ces vaccins.
 Pour toute nouvelle vaccination hors ARNm, merci de vous reporter aux fiches Novavax.



*En cas d'infection Covid intercurrente moins de 15 jours après la première dose, il est recommandé de respecter un délai minimal de 2 mois après l'infection pour procéder à la seconde injection.

**En cas d'infection Covid intercurrente, c'est-à-dire entre le dernier épisode vaccinal et la date prévue du rappel, il est recommandé de respecter un délai minimal de 6 mois après l'infection.

***L'utilisation d'un des deux vaccins adaptés (bivalents) à ARNm est préconisée pour les **rappels** contre le covid :

- Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (vaccin Pfizer-BioNTech bivalent adapté).
- Spikevax Original/Omicron BA.1 (vaccin Moderna bivalent adapté).

****Attention : le vaccin de Sanofi/GSK ne peut être utilisé **qu'à une seule reprise**. S'il a déjà été utilisé lors d'un épisode vaccinal précédent, il convient donc d'utiliser un autre vaccin.